



ПАМЯТКА ПО ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19

(СОСТАВЛЕНА СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЙ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР)

О ВАКЦИНЕ. ИНФОРМАЦИЯ

Вакцина "Гам-КОВИД-Вак", торговая марка «Спутник V» получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2, представляет собой раствор для внутримышечного введения. Препарат состоит из двух компонентов: компонент I и компонент II. В состав компонента I входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S-вируса SARS-CoV-2, в состав компонента II входит вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2. Хранение вакцины осуществляется в виде замороженного раствора при температуре ниже минус 18 °С. Оба компонента представляют собой плотную затвердевшую беловатого цвета массу. После размораживания: однородный бесцветный или с желтоватым оттенком слегка опалесцирующий раствор. Вакцина индуцирует формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

К проведению вакцинации против COVID-19 вакциной "Гам-КОВИД-Вак" допускаются медицинские работники, изучившие, и ознакомленные под подпись с настоящей стандартной операционной процедурой, прошедшие специальную подготовку и владеющие правилами организации и техники проведения вакцинации.

Вакцинацию против COVID-19 проводят вакциной "Гам-КОВИД-Вак" гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний, с их добровольного согласия в пункте вакцинации, согласно Алгоритму действий медицинских работников, осуществляющих проведение вакцинации против COVID-19 у взрослых, утвержденному Минздравом ДНР.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаниями к применению являются:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2 - 4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Противопоказания для введения компонента II:

- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °С и т.д.) на введение компонента I вакцины.

Применяется с осторожностью при:

хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации),

тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваний ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ КОМПОНЕНТОМ I

1. При себе необходимо иметь Медицинскую карту амбулаторного больного (форма № 025/у) или выписку из нее (форма № 027/у) от учреждения здравоохранения по месту проживания (регистрации), с указанием имеющихся и перенесенных заболеваний.

2. Заполнить анкету пациента (**выдается в пункте вакцинации перед осмотром врача**).

3. Пройти тестирование на наличие антител IgM и IgG (или суммарных антител IgA, M, G) к вирусу SARS-CoV-2. **Переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев не прививаются (проводится в пункте вакцинации, после заполнения анкеты пациента)**.

4. Пройти обязательный осмотр врачом с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, ЧСС, АД, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева (**проводится в пункте вакцинации врачом**).

5. Заполнить бланк добровольного информированного согласия на вакцинацию (**выдается в пункте вакцинации**).

ВНИМАНИЕ! К ВАКЦИНИРОВАНИЮ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА, ЗАПОЛНИВШИЕ АНКЕТУ ПАЦИЕНТА И НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВАКЦИНИРОВАНИЮ.

6. Пройти вакцинацию.

7. После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала прививочного пункта в течение 30 минут.

ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В большинстве случаев вакцинация проходит без осложнений.

Возможно, в первые - вторые сутки после вакцинации, могут развиваться и разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов.

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ КОМПОНЕНТОМ II

Вакцинация компонентом II проводится на 21 день после введения компонента I.

Перед введением компонента II проводится повторный осмотр врачом-специалистом с измерением температуры тела, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, ЧСС, АД, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева и заполнением добровольного информированного согласия.

Врач определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации компонентом II вакцины.

Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые поствакцинальные осложнения на введения компонента I вакцины.

После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала прививочного пункта в течение 30 минут.

После введения компонента II вакцины прививочным пунктом учреждения здравоохранения выдается Справка о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

